

Comment distinguer les différentes espèces d'amphibiens aux barrières de protection?

Crapaud commun (*Bufo bufo*)

Peau verruqueuse et présence de deux grosses glandes derrière les yeux; tympan peu visible; sans lignes latérales de glandes sur le dos; pas de tache foncée derrière les yeux (voir Grenouille rousse); iris orangé.



Grenouille rousse (*Rana temporaria*)

Peau lisse et absence de glandes derrière les yeux; tympan bien visible; tempes généralement foncées; couleur du dos brunâtre ou roussâtre, mais variable, parfois tacheté de noir; le plus souvent sans ligne claire au milieu du dos (voir Grenouilles vertes); 2 lignes de glandes latérales sur le dos.



Grenouilles vertes (*Pelophylax* agg.)

Couleur du dos verdâtre; souvent avec une ligne vert claire au milieu; en général avec des taches noires sur le dos et sur les jambes; peau lisse; tympan bien visible; tempes le plus souvent sans taches foncées (voir Grenouilles rouges); 2 lignes de glandes latérales plus claires que le dos.



(couleur inhabituelle)

Triton alpestre (*Ichthyosaura alpestris*)

Ventre orange vif et non tacheté; cou orange, parfois avec quelques points foncés; petits points noirs et blancs sur les flancs; dos foncé, parfois marbré; mâles pourvus d'une petite crête dorsale rayée de noir et blanc (ou jaune).



Triton crêté (*Triturus cristatus*)

Ventre sur toute la largeur d'une couleur orange vif avec des taches noires; cou en général foncé-ponctué (voire aussi cou chez le Triton lobé). La ligne de séparation entre le ventre orange et les flancs sombre est composée de taches rondes. Raie de couleur blanchâtre sur les deux côtés de la queue chez les mâles. Crête pas encore formée lors de la migration.



Triton lobé (*Lissotriton vulgaris*)

Peut être confondu avec le Triton palmé, mais gorge claire tachetée de noir (taches noires pas toujours bien visibles chez les femelles); ventre jaunâtre (orange au milieu) souvent tacheté de noir; dos brunâtre, chez les mâles avec des taches foncées rondes. Pas de filament au bout de la queue.

Peut être confondu avec le Triton crêté, mais plus petit, dos pas foncé, ventre *pas* orange vif (orange tout au plus au centre du ventre). Si des taches noires sont présentes sur le ventre, elles sont réparties irrégulièrement et ne pas concentrées uniquement en bordure. Comparer le cou avec celui du Triton crêté.



Triton palmé (*Lissotriton helveticus*)

Peut être confondu avec le Triton lobé, mais gorge claire non tachetée; ventre beige (orange seulement au milieu), parfois avec des taches noires; dos brunâtre; queue souvent prolongée d'un petit filament (2 à 8 mm); deux minuscules tubercules jaunes à la face inférieure des pattes arrières.

