# Essai : intégrer du plantain lancéolé dans les prairies temporaires

# Versuch: Spitzwegerich in Kunstwiesen integrieren

**La croissance des prairies est perturbée durant les étés plus chauds, et est décalée plus tôt au printemps et plus tard en automne.**

Objectif
Comparer la composition botanique, le rendement et la valeur nutritive de trois mélanges fourragers.

Essai
3 mélanges x 3 essais x 3 ans chacun
- ✓ Standard
- ✓ Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata*)
- ✓ Luzerne

Résultats
- Rendement estival: ↑ 10 % vs standard ; ↓ 15% vs luzerne
- Diminution progressive du plantain lancéolé au fil des ans
- Les proportions varient durant la saison de végétation
- Valeur nutritive intermédiaire entre standard et luzerne

Conclusions
- ➢ Espèce pas révolutionnaire, mais un bon compagnon
- ➢ Bonne appétence en pâture
- ➢ Croissance hivernale parfois intéressante
- ➢ En période de chaud et de sec, pas compétitif avec des « spécialistes » comme la luzerne ou le dactyle

**Die Hitze im Sommer beeinträchtigen das Wachstum von Wiesen und Weiden und führen dazu, dass es im Frühjahr früher und im Herbst später einsetzt.**


Ziel
Vergleich der botanischen Zusammensetzung, des Ertrags und des Nährwerts von drei Futtermischungen.

Versuch
3 Mischungen × 3 Versuche × jeweils 3 Jahre
- ✓ Standard
- ✓ Spitzwegerich (*Plantago lanceolata*)
- ✓ Luzerne

Ergebnisse
- Sommerertrag: ↑ 10 % vs. dem Standard; ↓ 15 % vs. Luzerne
- Spitzwegerich-Anteil sinkt über die Jahre
- Die Anteile variieren während der Vegetationsperiode
- Nährwert liegt zwischen Standard und Luzerne

Schlussfolgerungen
- ➢ Keine bahnbrechende Art, aber ein guter Begleiter
- ➢ Gute Fresslust auf der Weide
- ➢ Manchmal interessantes Winterwachstum
- ➢ In heissen und trockenen Perioden nicht konkurrenzfähig gegenüber „Spezialisten“ wie Luzerne oder Knaulgras






Sources photos : Grangeneuve