

RÉSEAU FRIBOURGEOIS DE SANTÉ MENTALE

FREIBURGER NETZWERK FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

RÉSEAU FRIBOURGEOIS
DE SANTÉ MENTALE
FREIBURGER NETZWERK
FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Buvidal Depot (Buprenorphin): Bilanz nach einem Jahr



Dr. Rafik Bouzegaou
Leitender Arzt, Freiburger Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen, FNPG
12. November 2026


Frau Claudine Gex
Pharmacie Plus Dr Repond
12. novembre 2026


- Erklärung zu Interessenkonflikten

- Kein finanzielles Interesse
- Keine Tätigkeit für die Pharmaindustrie


RÉSEAU FRIBOURGEOIS
DE SANTÉ MENTALE
FREIBURGER NETZWERK
FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Opioid-Agonisten-Therapien (OAT) im Kanton Freiburg, 2026





- Sofortige Wirkstofffreisetzung nach Injektion
- Freisetzungsrate wird durch Lipidzusammensetzung und Nanostruktur des Gels bestimmt




1. Injection of liquid formulation using prefilled syringe
2. Encapsulating liquid crystal gel triggered by water uptake
3. Slow release of drug
4. Drug release and biodegradation of gel matrix to full resolution

NMP : N-methylpyrrolidone


1. Tiberg F et al. Chem Lett. 2012;41:1090-92; 2. Tiberg F et al. J. Drug Deliv Science Tech. 2011;21:101-9;

Abwechselnd in folgende Stellen injizieren: Gesäss, Oberschenkel, Bauch und Oberarm; Abstand von mind. 8 Wochen, bevor bereits genutzte Injektionsstelle erneut verwendet wird. Injektionen im Taillenbereich, weniger als 5 cm vom Bauchnabel entfernt, vermeiden.

8 Injektionsstellen:




Vorderseite **Rückseite**




Fachinformation Buvidal®, März 2024, www.swissmedicinfo.ch

Darstellung der pharmakokinetischen Populationsprofile für Buvidal und sublinguales Buprenorphin. Plasmakonzentrationen – Wie lange hält die Wirkung an?

Buvidal Q1W - BPN sublingual quotidien



Buvidal Q4W - Buvidal Q1W



Analyse des pharmakokinetischen Populationsmodells auf der Grundlage von Daten aus klinischen Studien (N = 236). Die diagnostischen Tests ergaben vorhersagbare BPN-Konzentrationen und eine gute Übereinstimmung zwischen den beobachteten und den vorhergesagten Daten. Daten im Gleichgewicht. Logarithmische y-Achse.

1- Albayaty M et al. Adv Ther. 2017;34:560-75; Données non publiées, Camurus ***AB, Suède;*** ***2- Björnsson M et al. Clin Pharmacokinet. 2023;62:1427-43***

• Übergang zu Depot

- Clarifier **l'indication** avec le patient
- **Limitatio** vérifiée et documentée (liste des spécialités)

Buvidal Depot

Inj Lös 24 mg/0.48ml
(Buprenorphinum 24 mg)

Conformément à l'annexe 1 de l'OPAS (RS 832.112.31), cf. chapitre 8, Psychiatrie et psychothérapie / Traitement par agonistes opioïdes (TAO) en cas de syndrome de dépendance aux opioïdes.

Pour le traitement de substitution en cas de dépendance aux opioïdes chez les patients n'ayant pas présenté de réponse suffisante à un traitement par la buprénorphine administré par voie orale.
L'injection hebdomadaire à libération prolongée sert de traitement d'attaque.

- **Changement** possible **sans complication** d'un jour à l'autre
  - La veille : dernière prise du comprimé sublingual
  - Le jour du changement : injection s.c., pas d'autre comprimé



À ne pas oublier : **commander le dépôt à temps**, la livraison peut prendre plusieurs jours selon les cas


*Informations professionnelles Buvidal®, mise à jour : mars 2024, www.swissmedicinfo.ch

• Mögliche Dosierungen von Buvidal



Posologie quotidienne SL BPN	Posologie hebdomadaire de Buvidal	Posologie mensuelle de Buvidal
2-6 mg	8 mg	-
8-10 mg	16 mg	64 mg
12-16 mg	24 mg	96 mg
18-24 mg	32 mg	128 mg

** Informations professionnelles Buvidal®, mise à jour : mars 2024, www.swissmedicinfo.ch*




Fachinformation Buvidal®, März 2024, www.swissmedicinfo.ch

RÉSEAU FRIBOURGEOIS
DE SANTÉ MENTALE
FREIBURGER NETZWERK
FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

UNLOC-T

Von den Betroffenen angegebener Konsum nicht verschriebener Opioide



Der von den Patienten angegebene Konsum nicht verschriebener Opioide ging zwischen Studienbeginn (97 %) und Woche 16 (12 %) zurück (OR = 0,0035, IC 95 %; 0,0007–0,018, p < 0,0001)


Dunlop A et al. Addiction. 2021;117:382-91

RÉSEAU FRIBOURGEOIS
DE SANTÉ MENTALE
FREIBURGER NETZWERK
FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Zufriedenheit der Patienten mit der Behandlung


Lebensqualität und Behandlungsaufwand bei Buvidal im Vergleich zu täglicher sublingualer Behandlung mit BPN/NX

Gesamteinschätzung des Patienten hinsichtlich der Besserung (PGI-I)




Scale 1–7. A higher score indicates perceived worse health condition vs. the start of treatment.

Frage zur Behandlungsbelastung (TBQ)



Scale of 0–150. A higher score indicates greater treatment burden.

Lebensqualität in der Opiat-Substitutionsbehandlung (OSTQoL) – Bereich OST



Scale of 0–4. A higher score indicates better QoL.

BPN : buprénorphine ; NX : naloxone ; OSTQoL : qualité de vie dans le traitement de substitution aux opiacés ; PGI-I : impression globale du patient quant à l'amélioration ; PRO : résultat rapporté par le patient ; SL : sublingual ; TBQ = questionnaire sur la charge thérapeutique

Lintzeris N et al. JAMA Netw Open. 2021;4:e219041; données dans les dossiers, Camurus AB, Suède

Angemessene Information und Beratung

- Innovative Technologie ermöglicht verlängerte Freisetzung von Buprenorphin
- Einmal pro Woche oder Monat, subkutan (nicht intramuskulär!)
- Zusätzliche Dosis möglich falls nicht ausreichend
- Injektion wird oft als brennend, aber erträglich, beschrieben
- Spürbarer «Knoten» an der Einstichstelle aufgrund des Depots
- Handhabung ähnelt stark der eines Impfstoffs: feine Nadel (23 G), geringes Volumen
- Informationen zu den Vorteilen und Risiken

1. Lofwall MR, et al. JAMA Intern Med. 2018 ; 178(6) : 764-773. 2. Frost M et al. Addiction. Août 2019 ; 114(8) : 1416–1426. * *Fachinformation Buvidal®, März 2024, www.swissmedicinfo.ch*

• Vorteile von Buvidal

- **Erhebliche Vereinfachung und Flexibilität im Alltag:**
- Keine tägliche Einnahme mehr (keine 10 min. unter der Zunge)
- Kein ständiges daran denken
- Wegfall der üblichen «OAT-Verpflichtungen» (Apothekenbesuch, festgelegte Zeiten, Nachweis versäumter Einnahmen usw.)
- **Gute Therapietreue, garantierte Opioidverträglichkeit**
- **Grundsätzlich sind weitere Gespräche / Therapieziele möglich**
- **Reisen ohne zusätzlichen Aufwand, ohne Einschränkungen, ohne Genehmigung**
- **Unterstützung eines Lebensstils ohne Störungen durch Konsum (keine täglichen Konsumrituale)**
- **Mehr Selbstständigkeit und höhere Lebensqualität**

+1. Lofwall M et al. JAMA Int Med. 2018 ; 178 : 764-773. 2. Frost M et al. Addiction. 2019 ; 114 : 1416-1426. 3. Parkin S et al. Int J Drug Policy. Décembre 2023 ; 122 : 104221

Risiken von Buvidal

- **Solange keine anderen schwerwiegenden Störungen im Zusammenhang mit dem Konsum stark sedierender Substanzen vorliegen, ist das Risiko schwerwiegender unerwünschter Wirkungen bei der Verabreichung von Buprenorphin-Depot gering**
- **Buprenorphin scheint bei opioid-toleranten Erwachsenen aufgrund eines Plateu-Effekts ein geringes Risiko für eine potenziell lebensbedrohliche Atemdepression zu bergen**

1. Lofwall M et al. JAMA Int Med. 2018 ; 178 : 764-773. 2. Frost M et al. Addiction. 2019 ; 114 : 1416-1426. 3. Dahan A et al. Br J Anaesth. Mai 2006 ; 96(5) : 627-32. 4. Wightman RS et al. J Med Toxicol. Janvier 2021 ; 17(1) : 10-15

• Was ist zu beachten?

- **Abwesenheiten** (bei Nichterscheinen zu den Terminen für die Depotinjektionen ist möglicherweise eine neue Dosierung erforderlich)
- Informationen zum fortschreitenden Toleranzverlust bei Absetzen der Injektionen
- **Unerwünschte Wirkungen**: Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen: sehr häufig gem. Compendium
- Betreuung von Patienten, die BuP mit verzögerter Wirkstofffreisetzung einnehmen, sowie bei Operationen und Schmerzbehandlungen
- Rückkehr zu einem vollständigen OAT-Agonisten erfordert mehr Zeit

* Fachinformation Buvidal®, März 2024, www.swissmedicinfo.ch

RÉSEAU FRIBOURGEOIS
DE SANTÉ MENTALE
FREIBURGER NETZWERK
FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Merci de votre attention
Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit
Freiburger Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen

Rafik.Bouzegaou@rfsm.ch
T. +41 26 308 1700