

Conflits

Le loup ne constitue pas un danger pour l'humain. Au-delà des mythes, si des attaques de loups sur des humains ont ponctuellement eu lieu par le passé, elles étaient surtout le fait d'individus porteurs de la rage ou se défendant d'agression humaine.

L'élevage est le principal secteur touché par le retour du loup. Même si le canidé ne cause qu'une part minime des pertes d'animaux de rente, sa présence induit la nécessité de mettre en place des mesures de protection.

Que faire ?

Que faire lors de la découverte d'une proie (animaux sauvages ou animaux de rente) :

- Ne pas toucher l'animal afin de ne pas le contaminer avec votre ADN ;
- Informer dans les plus brefs délais le/la garde-faune responsable de la circonscription concernée ;
- Donner des informations concernant la proie retrouvée (lieu, espèce, traces, etc.).

Le loup



Protégé ?

Le loup est une espèce protégée en vertu de la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP).


Conformément aux dispositions légales en vigueur, des interventions peuvent être autorisées à l'encontre des loups qui causent des dommages importants malgré la mise en œuvre de mesures de protection raisonnables (tirs réactifs). Par ailleurs, sous réserve du respect des conditions fixées par la législation, des tirs proactifs peuvent également être autorisés afin de prévenir des dommages ou de limiter les risques de conflits avec les activités humaines.

Mesures

Dans les zones où le loup est présent, la Confédération subventionne la mise en place de mesures de protection des troupeaux.

Les mesures les plus efficaces sont les suivantes :

- l'utilisation de chiens de protection ;
- la mise en place de clôtures électrifiées.



Contact

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le ou la garde-faune de votre région ou avec la centrale du SFN.



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service des forêts et de la nature SFN
Amt für Wald und Natur WNA



www.fr.ch/sfn



Portrait

Nom scientifique *Canis lupus*

Famille Canidés

Poids 15 - 80 kg
(30 - 50 kg en CH)

Long. sans queue 110 - 150 cm

Taille au garrot 60 - 90 cm

Couleur Beige-gris avec un
masque facial clair

Régime alimentaire Carnivore

Durée de vie 10 - 12 ans

Statut en Suisse Protégé (LChP)



Habitat

De la toundra arctique aux déserts chauds, des forêts mixtes aux zones densément peuplées par l'humain, le loup possède une très grande adaptabilité. Le canidé peut parcourir plus de 20 km par jour. Une fois installé, le territoire d'un loup s'étend sur plus de 200 km² (en Europe).



Indices

Les traces de pattes des loups et des chiens sont difficilement différenciables. La piste d'un loup se distingue par contre de celle d'un chien en raison de son aspect rectiligne. Par ailleurs, du fait que le loup se déplace le plus souvent au trot, la trace de la patte postérieure se confond dans la trace de la patte antérieure.



Répartition

A la fin du XIXe siècle, le loup est devenu vulnérable en raison de la diminution de ses proies causée par une chasse non régulée et la surexploitation des forêts. Les efforts pour l'exterminer ont mené à sa disparition dans de nombreux pays d'Europe de l'Ouest. Grâce au retour de conditions favorables ainsi qu'à sa protection, le loup recolonise naturellement la Suisse depuis 1995.



Biologie

Le loup est un carnivore opportuniste qui s'adapte aux proies en présence. S'il consomme principalement des cerfs, des chevreuils et des sangliers, le loup peut aussi chasser des lièvres, des petits mammifères et être charognard. Il peut également s'attaquer à des animaux de rente, notamment aux troupeaux ne bénéficiant pas de mesures de protection.

La saison de la reproduction s'étend entre février et mars. Au sein d'une même portée, 3 à 8 louveteaux naissent après 63 jours de gestation. Généralement, les jeunes mâles quittent la meute dès l'âge de 8 mois tandis que les femelles restent une année de plus au sein de la meute.



Monitoring

Afin d'obtenir des informations sur l'utilisation spatiale des loups, un monitoring est effectué. Les données utilisées proviennent de différentes sources :

- Observations directes ;
- Pièges photographiques ;
- Analyses génétiques ;
- Traces ;
- Inspection des proies ;
- Enregistrements audio.

