




ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG



COVID19
Fribourg Freiburg
www.fr.ch

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD

Vaccin Nuvaxovid® de Novavax

Fiche d'information pour les patient-e-s

Etat au 28.10.2022



Le vaccin Nuvaxovid® de Novavax est un vaccin à base de protéines, c'est-à-dire qu'il contient des fragments (protéines) inoffensifs du virus qui ont été choisis pour déclencher une réponse immunitaire. Le vaccin de Novavax offre une bonne protection contre les maladies dues au COVID-19. Selon les données actuelles, son efficacité contre les infections symptomatiques et les formes sévères du COVID-19 est comparable à celle des vaccins à ARNm. Pour les adultes qui ne peuvent (p. ex. en raison d'une allergie) ou qui ne souhaitent pas se faire vacciner avec un vaccin à ARNm, un vaccin à base de protéines peut servir d'alternative.

Pour plus d'informations sur les vaccins à base de protéines : www.ofsp-coronavirus.ch, cliquer sur la rubrique « Vacciner » puis sélectionner « Comment fonctionne la vaccination ? ».

Indication

Vaccination de base :

- Pour les **personnes non vulnérables à partir de 16 ans** qui ne sont pas encore vaccinées contre le COVID-19, une seule dose de vaccin est recommandée.* Il est également possible de recevoir 2 doses de vaccin à 4 semaines d'intervalle, notamment si l'on suppose que vous n'avez jamais contracté le virus ou si vous prévoyez un voyage à l'étranger.
- Pour les **personnes vulnérables (à l'exception des femmes enceintes ou allaitantes)**** qui ne sont pas encore vaccinées contre le COVID-19, deux doses à environ 4 semaines d'intervalle sont recommandées.

Vaccination de rappel :

- Une dose (0,5 ml) est vivement recommandée à toutes les **personnes vulnérables (à l'exception des femmes enceintes ou allaitantes)****. Toutes les autres personnes à partir de 16 ans peuvent également recevoir une vaccination de rappel.

L'intervalle écoulé depuis le précédent vaccin contre le COVID-19 ou une infection au COVID-19 doit être **de 4 mois au moins**.

* Ne donne pas droit à un certificat COVID mais uniquement à un justificatif.

** Personnes de 65 ans et plus, personnes de plus de 16 ans avec maladies chroniques (hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies des poumons et des voies respiratoires, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à un traitement, cancer, obésité (IMC ≥ 35 kg/m²), insuffisance rénale, cirrhose du foie), personnes de plus de 16 ans atteints de la trisomie 21

Contre-indications au vaccin Nuvaxovid®

- > Les personnes de moins de 12 ans
- > Les femmes enceintes ou allaitantes (manque de données)
- > Immunosuppression, sauf si contre-indication médicale aux vaccins à ARNm
- > Allergie à l'un des composants de ce vaccin, en particulier sensibilisation immédiate connue ou probable au polysorbate 80 (E433), aux saponines ou à l'adjuvant Matrix-M

Effets secondaires

Toute vaccination peut avoir des effets secondaires. Le plus souvent, ils sont légers et passent rapidement. Les effets secondaires sévères sont très rares (par exemple, une forte réaction allergique immédiatement après l'injection).

Les effets secondaires suivants sont possibles : des réactions au point d'injection, telles que douleur, rougeur et gonflement ; des maux de tête ; de la fatigue ; des douleurs musculaires et articulaires ; des nausées ou des vomissements.

Ces effets secondaires surviennent souvent après une vaccination. Ils montrent que le corps active son système immunitaire et développe une protection. Sous une forme légère, c'est donc un bon signe. Une réaction allergique peut provoquer, immédiatement après la vaccination, un important gonflement, une rougeur, des démangeaisons ou des difficultés à respirer. Si ces symptômes apparaissent, contactez immédiatement votre médecin.

En général, les effets secondaires disparaissent après 1 à 3 jours. Ils répondent bien à la prise de Paracétamol.

Autres effets secondaires rares

A l'heure actuelle, le risque d'autres effets secondaires rares, exceptionnels ou graves ne peut être exclu. Ces effets secondaires surviennent dans les mois qui suivent la vaccination. Toutefois, dans l'état des connaissances actuelles, le risque est très faible.

Comme les autres vaccins contre le COVID-19, le vaccin Nuvaxovid® de Novavax n'a aucun effet sur la fertilité.

Avez-vous encore des questions ?

Infoline de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) 058 463 00 00

Hotline santé du canton de Fribourg 080 026 17 00

www.fr.ch/vaccination-covid

PRENEZ SOIN DE VOUS !