



Stadt Zürich

Soziale Einrichtungen
und Betriebe

Opioïdes synthétiques

13.11.2025

Formation continue TAO, Kanton Freiburg

Dominique Schori, Drogeninformationszentrum (DIZ)

1 Définition des termes

Opiacés et opioïdes



Opiacés: Substances extraites de l'opium, le latex séché du pavot à opium (*Papaver somniferum*).

Opioïdes: Opiacés et substances (semi)-synthétiques qui se lient aux récepteurs opioïdes du système nerveux et sont prescrites contre les douleurs intenses.

Nitazènes

- Recherchés à la fin des années 1950 comme analgésiques potentiels
- Jamais développés jusqu'à la commercialisation en raison d'une faible marge thérapeutique et d'un rapport effets/effets secondaires défavorable.
- Puissance analgésique : extrêmement élevée !
- Nombreux dérivés en circulation
- Augmentation des cas d'intoxication en Europe
- Questions ouvertes concernant le début d'action/la détectabilité

Opiïdes synthétiques

Généralités

- Utilisation médicale
 - Traitement des douleurs intenses
 - Anesthésiques
 - Antitussifs
 - Thérapie agoniste opioïde (TAO)
- Le fentanyl est soumis à la loi sur les stupéfiants (LStup) en tant que substance commercialisable soumise à toutes les mesures de contrôle.
- Les nitazènes sont souvent commercialisés illégalement sous forme de contrefaçons de médicaments, comme les comprimés d'oxycodone.


Opioïdes synthétiques

Effet

- Agissent sur des récepteurs spécifiques du système nerveux central (SNC).
- Analgésiques, sédatifs, calmants et euphorisants
- La consommation d'opioïdes synthétiques active le système de récompense, ce qui est la principale raison de leur utilisation non médicale.
- L'effet analgésique d'une substance dépend de la dose. La mesure en est la puissance analgésique (diapositive suivante).
- Dosage difficile en raison de la forte puissance


Puissance analgésique de différents opioïdes

**Les nitazènes sont
probablement beaucoup
plus puissants que le
fentanyl \!**



Situation initiale

Situation initiale



Évolution depuis 2023

- En Europe, les dérivés de nitazènes plutôt que de fentanyl sont au premier plan (dynamique de marché spécifique).
- Aussi bien comme agent de coupe que comme substance primaire (notamment via les boutiques en ligne).
- Divers cas isolés dans de nombreux pays
- Appel à l'action de l'EUDA (juin 2024) :

« Compte tenu des conséquences négatives potentielles de cette situation, l'Europe doit améliorer sa préparation aux défis de la réduction des risques et autres que ce changement de marché pourrait entraîner. »

Exemple Suisse – Professionnalisation des contrefaçons

Janvier 2025 (DIZ)



Exemple Pays-Bas mars 2025

REDALERT

18-03-2025

ALERT

Fake oxycodone pills in circulation

Isotonitazepyne sold as oxycodone

- Instead of oxycodone, this pill contains the life-threatening nitazene **isotonitazepyne**.
- Using isotonitazepyne results in **troubled breathing, unconsciousness or death**.
- This pill was bought online as oxycodone and is associated with at least one fatal incident in The Netherlands.
- Do **not** use opioid painkillers that have been bought online.



Call 112 and ask for naloxone if you or someone else has taken this pill and has trouble breathing or loses consciousness. Stay calm and don't leave them alone.

Scan for more information



-ruimte voor IVZ logo-

Trimbos
instituut

Exemple Autriche – juin 2025

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Substanzwarnung

Hohes Risiko!

am 30.06.2025 als **Heroin** zur Analyse abgegeben

Tatsächlicher Inhaltsstoff:
Fentanyl: 41 mg/g





**VOM KONSUM WIRD
DRINGEND ABGERATEN!**

Diese Substanz wurde als **Heroin** unter dem Namen „Thai-H“ am Schwarzmarkt erworben. Im Zuge der Laboranalyse wurde jedoch ausschließlich **Fentanyl (4,1% Wirkstoffgehalt)** in der Probe nachgewiesen!

Fentanyl ist ein **synthetisches Opioid** und ist etwa um das 100-fache potenter als Morphin, bzw. 50-mal stärker als Heroin. **Fentanyl wirkt bereits in der kleinsten Dosis und kann darum (außerhalb des medizinischen Einsatzes) kaum adäquat und risikoarm dosiert werden!**

Nouveaux développements – L'interdiction des nitazènes en Chine

China Bans Nitazenes: Could Fentanyl Fill the Void in the UK and Europe?



Tony D'Agostino

Director COCA / TD Consultancy. Helping you to effectively respond to the challenges within the drug and alcohol field.

Veröffentlicht: 24. Juni 2025

+ Folgen

On 1 July 2025, China will officially place all nitazene-related substances under national drug control. This move, announced by the Office of China National Narcotics Control Commission, signals yet another step by the Chinese government in its ongoing battle against the manufacture and export of synthetic opioids.

[China Bans Nitazenes: Could Fentanyl Fill the Void in the UK](#)




TECHNICAL REPORT

Understanding the impact of the Taliban drug ban

Situational analysis of Afghanistan to inform EU policymakers

May 2025



Comprendre l'impact de l'interdiction des drogues par les talibans : analyse situationnelle de l'Afghanistan pour informer les décideurs politiques de l'UE | www.euda.europa.eu

Le plan d'action de la Ville ZH

Comparaison trompeuse entre les États-Unis et la Suisse

Bald Drogen-Zombies in Zürich?

Experte: «Schweiz ist nicht sicher vor Fentanylkatastrophe»

«Fixerstübli», wie sie Zürich in der Hochphase des Platzspitz-Desasters testete, bleiben in San Francisco ein Ding der Unmöglichkeit. Experten vor Ort warnen: Auch der Schweiz könnte jederzeit eine Fentanyl-Krise drohen.



Vorbereitung auf Fentanylkrise

Umgang mit Fentanyl: Zürich wappnet sich gegen Todesdroge

Mittwoch, 05.02.2025, 13:30 Uhr
Aktualisiert um 17:30 Uhr

TEILEN

- Die Stadt Zürich will synthetischen Opioiden mit einem Massnahmenplan begegnen.
- Betroffene sollen Therapien erhalten. Grundsätzlich will die Stadt verhindern, dass Fentanyl Zürich erreicht.

In den USA starben letztes Jahr über 100'000 Menschen an der Droge.

Domaine d'intervention A : Intensification du suivi du marché

- Drug Checking régulier en ECS/Centres d'accueil (depuis octobre 24)
- Mise en place d'une base de données pour K\&A (suivi de la consommation)
- Développement de l'échange de données entre FOR/Douanes/Infodrog/DIZ etc.
- Développement de l'échange international (bilatéral et via les réseaux correspondants)
- Formation d'un groupe de travail pour les laboratoires (défis analytiques)
- Discussion en cours avec l'EAWAG (Exemple Australie)
- Rôle de la Confédération toujours passif (cf. postulat Ryser)
- Nouveau système européen d'alerte aux drogues de l'EUDA (2025)

Domaine d'intervention B : Information et communication

- Atelier avec S&R, scénarios d'escalade vérifiés
- Adresse de déclaration centrale – discussion avec l'OFSP
- Le distributeur d'alertes DIZ est étendu
- Les alertes pour les réseaux internationaux sont étendues ([WHO](#), [Correlation](#), European Harm Reduction Network)
- Adapter le contenu aux groupes cibles comme priorité ([Webinar Nitazenes](#) 9.5.)

Domaine d'intervention C : Tests rapides


- Les produits sont évalués
- Le cadre quantitatif est défini
- La fiche d'information est finalisée
- La mise en œuvre via K\&A est effectuée
- La formation des collaborateurs est effectuée (focus sur ECS/centres d'accueil)

Mode d'emploi des bandelettes réactives

Fentanyl Teststreifen Anleitung

Das Prüfgerät ist nicht dazu bestimmt, die Reinheit, die Zusammensetzung oder die Unbedenklichkeit des untersuchten Stoffes zu bestimmen. Ein positives oder negatives Testergebnis ist kein Hinweis darauf, dass die untersuchte Substanz sicher zu verwenden ist.

1. Mischen Sie Ihre Drogenprobe vor dem Test gründlich. Verdünnen Sie die zu testende Droge in Wasser. Ein Messlöffel der Arzneimittelprobe sollte in 5 ml Wasser verdünnt werden.
2. Öffne die Verpackung und benutze das Kit so schnell wie möglich. Für ein zuverlässiges Ergebnis max. eine Stunde nach dem Öffnen.
3. Halten Sie den Streifen am Ende fest, wo der Produktname (FYL) aufgedruckt ist. Um Verunreinigungen zu vermeiden, berühren Sie die Streifenmembran nicht (weisser Testteil).



4. Halten Sie den Teststreifen senkrecht und tauchen Sie ihn mindestens 10–15 Sekunden lang in die Flüssigkeit. Tauchen Sie den Streifen dort ein, wo sich die Wellenlinien befinden, aber nicht über die durchgezogene (maximale) Linie auf dem Teststreifen.
5. Entfernen Sie den Streifen von der Probe und legen Sie ihn auf eine nicht saugende, ebene Fläche. Starten Sie den Timer und warten Sie, bis die farbige(n) Linie(n) erscheinen.



6. Ein negatives Ergebnis kann interpretiert werden, sobald sowohl die Testlinie (T) als auch die Kontrolllinie (C) erscheinen. Ein Ergebnis kann als positiv gewertet werden, wenn 60 Sekunden seit dem Erscheinen der Kontrolllinie vergangen sind und keine Linie für diese Droge vorhanden ist. Ergebnis nach 10 Minuten nicht mehr lesen.

Domaine d'intervention D : Naloxone à emporter

- Adaptation de la catégorie de remise par Swissmedic fin juin
- Première journée d'action en ECS/Centres d'accueil prévue en septembre 2025
- Remise aux clients ECS/Centres d'accueil par les collaborateurs ECS/Centres d'accueil

Domaine d'intervention F : Sensibilisation des professionnels

- Des formations pour tous les employés municipaux ont eu lieu en mai, lien vers la vidéo.
- Toujours au centre des préoccupations : discussion sur la sécurité des employés (mythes tenaces)
- [Fiche d'information](#) sur les SO élaborée en coopération avec Infodrog.

Domaine d'intervention G : Sensibilisation des consommateurs

- Publications continues sur Instagram/[saferparty.ch](https://www.instagram.com/saferparty.ch) (en DE et EN)et [Alertes substances - infodrog.ch](https://www.infodrog.ch/alertes-substances)
- Sensibilisation ciblée des consommateurs d'opioïdes
- Le « travail de traduction » pour les clients K\&A est en cours.

Merci beaucoup.

Dominique Schori

Dominique.schori@zuerich.ch

diz@zuerich.ch