



Nuisances

Les goélands leucophées nichant au bord des lacs causent rarement des problèmes. En revanche, ceux installés sur des toits près des habitations ou dans les zones industrielles peuvent être bruyants,



surtout de mars jusqu'à l'envol des jeunes. Ils peuvent aussi attaquer les personnes qui s'approchent de leurs nids ou effectuent des travaux sur les toits afin de protéger leur progéniture.



Conflit

Dominance

Espèce très dominante, le goéland leucophée occupe souvent les meilleurs sites de nidification et concurrence des oiseaux plus rares, comme la mouette rieuse ou la sterne pierregarin.

Cette compétition réduit les possibilités de nidification de ces espèces et peut nuire à leur succès reproducteur.

Le Goéland leucophée



Que faire ?

Les goélands leucophées, leurs nids, leurs œufs et leurs jeunes sont protégés. La meilleure solution consiste à empêcher leur installation sur les toits en rendant ces sites moins attractifs.

Les mesures possibles sont les suivantes :

- enlever le gravier des toitures (les toits sans gravier sont moins attractifs)
- effectuer des passages réguliers sur les toits fin mars et en avril
- placer des objets mobiles et brillants (bandes réfléchissantes, ballons effaroucheurs)
- poser des formes de prédateurs en plastique (chat, chien, renard)



Que faire ?

Pour protéger les mouettes rieuses et les sternes pierregarins, des grilles métalliques ou des cordes peuvent être installées sur les plateformes de nidification. Ces dispositifs limitent l'accès aux goélands leucophées tout en laissant passer les espèces plus petites. À plus long terme, la revitalisation des cours d'eau et des zones humides permet de recréer des sites de nidification naturels.



Contact

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le ou la garde-faune de votre région ou avec la centrale du SFN.



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service des forêts et de la nature SFN
Amt für Wald und Natur WNA



www.fr.ch/sfn



Portrait

Nom scientifique	<i>Larus michahellis</i>
Famille	Laridae
Poids	800 - 1500 g
Envergure	env. 140 cm
Reproduction	fin mars - juillet
Nombre d'œufs	2 - 3, une ponte par an
Incubation	4 semaines, mâle et femelle couvent
Âge maximal	21 ans
Effectif en Suisse (2026)	4500 individus
Statut	Protégé



Habitat

Les goélands nichent en colonies ou en couples isolés. Peu exigeants, ils installent leur nid au sol, sur des bancs de gravier, des plateformes, des îles, des jetées, des falaises ou sur les toits plats recouverts de gravier. Ils se nourrissent principalement au bord des lacs et des cours d'eau, dans les zones agricoles et à proximité des habitations.



Provenance

Autrefois rare en Suisse, le goéland leucophée a commencé à remonter la vallée du Rhône dans les années 1960.

Profitant de l'augmentation de ses effectifs en Méditerranée, il a colonisé les grands lacs suisses et s'est reproduit pour la première fois en Suisse en 1968, sur le lac de Neuchâtel.

Depuis 1980, la population a augmenté rapidement, dépassant pour la première fois les 100 couples en 1992, puis les 400 couples en 2000.



Répartition

Le goéland leucophée niche dans le canton de Fribourg surtout au bord des lacs de Neuchâtel, de Morat, de la Gruyère et de Schiffenen, mais également dans plusieurs localités, notamment à Morat, Gurmels, Fribourg et environs, Düdingen, Tfers, Grolley, Matran et Bulle. Tous les nicheurs ont été trouvés en dessous de 750 m d'altitude.



2026, Station ornithologique suisse



Biologie

 Son alimentation est très variée : déchets, vers, limaces, poissons, insectes, petits mammifères, oiseaux, œufs et carcasses.



Les jeunes prennent leur envol après 35 à 40 jours.



Une partie de la population est sédentaire, tandis que d'autres individus migrent. La plupart retournent en automne vers la Méditerranée.



Goéland ou mouette?



Les goélands leucophées sont plus grands que les mouettes rieuses. Ils ont des pattes et des becs jaunes, alors que les mouettes ont des pattes et des becs rouges. La tête des mouettes devient brune pour la période de reproduction. Les jeunes goélands n'ont pas encore de plumes grises, mais plutôt brunes. Leur bec est foncé et leurs pattes ne sont pas encore jaunes.