



Conflits

L'intensification de l'agriculture a contribué à de fortes réductions des populations de lièvres bruns durant ces 60 dernières années.

La fragmentation du paysage par les routes accentue la pression sur les populations.

Des stratégies de fauche adaptées permettent de réduire la mortalité des jeunes.



Que faire ?

- Aménager et maintenir des jachères florales, des jachères tournantes et des bandes de cultures extensives.
- Planter et maintenir des groupes de buissons bas.
- Étager les lisières de forêt.
- Pratiquer des fauches alternées et échelonnées.

Le lièvre brun



Qui est-ce ?

Le lièvre brun a les oreilles proportionnellement plus longues. Le ventre est blanc crème et la queue du lièvre brun est noire sur le dessus et blanche sur le dessous alors qu'elle est entièrement blanche chez le lièvre variable.



Lièvre brun




Lièvre variable



Construction

Le lièvre brun ne construit pas de terrier. Il se repose dans de petites dépressions à même le sol qu'il a creusé avec ses pattes antérieures. Il change d'emplacement d'une nuit à l'autre.



Contact

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le ou la garde-faune de votre région ou avec la centrale du SFN.



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service des forêts et de la nature SFN
Amt für Wald und Natur WNA



www.fr.ch/sfn



Portrait

Nom scientifique	<i>Lepus europaeus</i>
Ordre	Lagomorphes
Famille	Leporidés
Poids	3.4 - 5.7 kg
Taille	Jusqu'à 68 cm
Long. de l'oreille	8.5 - 13 cm
Régime alimentaire	Végétarien
Cycle d'activité	Pas d'hibernation
Durée de vie	Jusqu'à 8 ans
Portée	7 portées de 2 - 4 petits par année
Période protection	1 ^{er} janvier - 30 septembre



Habitat

Le lièvre brun se trouve dans des paysages ruraux caractérisés par une abondance de champs cultivés et une diversité de végétation, incluant par exemple des haies et des bosquets. Il n'est pas territorial.



Indices

Le lièvre brun fait des bonds de 1 à 3.5 m pour se déplacer. Ses pattes arrières sont posées l'une à côté de l'autre alors que les pattes avant sont l'une derrière l'autre.



Les traces

Les crottes sont des «billes» sèches de morceaux de plantes hachées et compressées. Elles se distinguent par leur couleur grisâtre et sont éparpillées.



Les crottes




Répartition

Le lièvre brun se trouve dans presque toute l'Europe et habite les milieux ouverts ponctués de buissons.



Répartition

En Suisse, on trouve l'espèce sur l'ensemble du Plateau et du Jura, dans les Préalpes et les vallées alpines jusqu'à 2000 m d'altitude.



Biologie

Le lièvre brun est un herbivore. Afin d'augmenter le niveau de digestion de la matière végétale avalée, il remange les crottes produites après le premier passage (caecotrophie).

Une femelle peut avoir jusqu'à sept portées de 2 à 4 petits par année qui vont naître entre les mois de février et d'octobre. La mise bas a lieu à même le sol. Le nouveau-né possède déjà une fourrure épaisse, des yeux fonctionnels et il est capable de se déplacer.

Le lièvre brun peut s'hybrider avec le lièvre variable dans les zones montagneuses.