



## Conflits

Les activités de sport d'hiver entraînent un niveau de stress élevé et une consommation d'énergie accrue chez le lièvre variable. Par conséquent, les individus ont besoin de davantage de nourriture qui n'est pas toujours disponible. Ceci peut avoir un impact négatif sur la reproduction et la survie.



## Menaces

Le réchauffement climatique représente une menace pour le lièvre variable car il modifie les habitats favorables et réduit la connectivité entre les populations existantes. Peu à peu, le lièvre variable va chercher des habitats adéquats dans des altitudes toujours plus élevées.

Dans les zones de montagne, on observe actuellement une hybridation entre le lièvre brun et le lièvre variable. Le réchauffement climatique pourrait augmenter le nombre de cas en raison de leurs habitats qui se chevauchent de plus en plus en ayant pour conséquence une perte de la génétique de l'espèce du lièvre variable.

## Le lièvre variable



## Qui est-ce ?

Le lièvre variable a les oreilles proportionnellement plus courtes et présente une morphologie plus trapue. La queue du lièvre brun est noire sur le dessus et blanche sur le dessous alors qu'elle est entièrement blanche chez le lièvre variable.



Lièvre variable




Lièvre brun




## Pelage

Le lièvre variable a une fourrure épaisse. En été, son pelage est gris-brun alors qu'en hiver il est blanc. Sa queue est blanche toute l'année. La mue a lieu au printemps et en automne.

Pelage d'hiver



Pelage d'été



Ce changement de pelage permet au lièvre variable de mieux se camoufler dans son environnement et ainsi se protéger des prédateurs.



## Contact

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le ou la garde-faune de votre région ou avec la centrale du SFN.



ETAT DE FRIBOURG  
STAAT FREIBURG

Service des forêts et de la nature SFN  
Amt für Wald und Natur WNA



[www.fr.ch/sfn](http://www.fr.ch/sfn)



## Portrait

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Nom scientifique   | <i>Lepus timidus</i>                    |
| Ordre              | Lagomorphes                             |
| Famille            | Leporidés                               |
| Poids              | 1.6 - 3.5 kg                            |
| Taille             | Jusqu'à 56 cm                           |
| Long. de l'oreille | 8.5 - 11.5 cm                           |
| Régime alimentaire | Végétarien                              |
| Cycle d'activité   | Pas d'hibernation                       |
| Durée de vie       | Jusqu'à 5 ans                           |
| Portée             | 2 - 3 portées de 2 - 3 petits par année |
| Période protection | 1 <sup>er</sup> janvier - 30 septembre  |



## Habitat

Le lièvre variable utilise principalement des habitats bien structurés dans les forêts d'altitude et à l'étage alpin. On le trouve également dans des forêts avec des habitats semi-ouverts avec des ronciers, des clairières ou des pâturages. Au dessus des forêts, on retrouve le lièvre variable toute l'année dans des pierriers parsemés d'herbes et d'arbrisseaux.

La neige est un facteur clé pour le lièvre variable. C'est elle qui modifie la disponibilité en nourriture et cachettes, ce qui influence très fortement la survie de l'espèce.



## Indices

Le lièvre variable peut écartier ses orteils et ainsi les utiliser comme des raquettes afin de faciliter ses déplacements dans la neige.

Les crottes du lièvre variable sont des «billes» sèches de morceaux de plantes hachées et compressées qui mesurent environ 1 à 1.5 cm de diamètre.



Les traces




Les crottes




## Répartition

Le lièvre variable se trouve dans les Alpes et habite des milieux tels que les pierriers, pelouses, pâturages et les forêts.



## Répartition

En Suisse, la présence du lièvre variable se limite aux Alpes et à des sites entre 800 et 3000 m d'altitude. Les zones de distribution principales se situent au niveau de la limite supérieure des forêts.



## Biologie

 Le lièvre variable est herbivore. Durant les hivers rigoureux, sous l'épais manteau neigeux, il se sustente de bourgeons et d'écorces. Ce mammifère est caecotrophe, il ingère de nouveau ses excréments pour optimiser la digestion des végétaux.

 Le lièvre variable est un solitaire, sauf pendant la saison de reproduction, appelée «bouquinage». Entre avril et juillet, après 50 jours de gestation, les femelles, appelées hases, peuvent donner naissance à 2-3 petits qui naissent poilus et avec les yeux ouverts. Les petits sont déposés séparément et la hase ne vient les voir qu'une fois par nuit pour les allaiter un court instant.