

 ETAT DE FRIBOURG STAAT FREIBURG	DOCUMENT DE REFERENCE Infection entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre élargi non E. coli (ESBL ou BLSE) – EMS et en institutions spécialisées pour adultes	Code : REF-174_F Fichier : F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système sanitaire\HPCI Version : 5 du 17.09.2026
--	---	--

Informations générales	
Informations générales sur l'agent infectieux	- ESBL (BLSE) sont des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi = bactérie résistante aux antibiotiques de la classe des bêtalactamines - Lors d'une infection à ESBL et non un portage, les bactéries sont présentes en plus grands nombres, d'où l'instauration de Mesures Additionnelles - Elles peuvent être à l'origine d'infection du sang, de l'urine, de la peau, d'infections respiratoires et d'infections abdominales. - Elles sont contenues dans le tube digestif et se propagent via les selles.
Mode de transmission	- Par contact direct, exemple : de personne à personnes, via les mains - Par contact indirect lorsque l'on touche l'environnement ou le matériel contaminé
Période d'incubation	Variable
Période de contagiosité	Variable, à savoir que le portage intestinal dure de quelques mois à plusieurs années
Mesures Additionnelles (MA) à mettre en place sur avis médical	CONTACT en cas d'infection à ESBL non E.coli 
Durée MA	Pendant toute la durée de l'infection d'entérobactéries non E. coli productrices d'ESBL

Prise en charge du résident.e	
Chambre	- Lors d'infection à ESBL non E. coli, avec diarrhées non-contenues et/ou incontinence fécale, à l'admission : chambre individuelle. - Lors d'infection à ESBL non E. coli, avec diarrhées non-contenues et/ou incontinence fécale, en cours de séjours en chambre double : chambre individuelle ou instaurer un isolement géographique avec non-partage des WC - Cohortage possible (placer plusieurs résident.e.s ayant le même agent infectieux dans la même chambre)
Sanitaire	Lors de diarrhées et/ou d'incontinence fécale et en l'absence de WC dans la chambre mettre à disposition de la-le résident.e infecté.e/porteur une chaise percée dédiée.
Circulation	Si diarrhées non-contenues et/ou incontinence fécale et/ou incapacité à maintenir le site infecté hermétiquement fermé (exemple par un pansement étanche ou une protection urinaire étanche ou une sonde vésicale sans fuite) :

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
Document de référence Infection entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre élargi non E.coli (ESBL ou BLSE)/site internet HPCI Fribourg	1 / 5	17.09.2026

	- La-le résident.e reste en chambre jusqu'à la fin des diarrhées et/ou incontinence fécale et/ou incapacité de maintenir le site infecté hermétiquement fermé - Ne participe pas aux animations et au repas en salle à manger - Limites les déplacements aux besoins vitaux Si absence de diarrhées et site infecté hermétiquement fermé (exemple par un pansement étanche ou une protection étanche ou sonde vésicale sans fuite) : - La-le résident.e circule librement, participe aux animations en collectivité et au repas en salle à manger
Equipement de Protection Individuel (EPI) pour le personnel	<u>En cas d'infection à ESBL non E. coli, avec diarrhées non-contenues et/ou incontinence fécale et/ou site infecté non-hermétiquement fermé :</u> Avant d'entrer en chambre, port de la surblouse : si contact direct avec la-le résident.e ou son environnement immédiat. Pas nécessaire si simple passage en chambre. Eliminer la surblouse en chambre, après 24 heures d'utilisation maximum.
Affiches signalétiques	Sur la porte de la chambre : À l'extérieur  À l'intérieur 
Matériel de soins	- Réserver au résident.e pendant la durée des Mesures Additionnelles. Si pas possible, désinfecter entre chaque résident.e - Privilégier le matériel à usage unique
Evacuation du linge et vêtements	Filière habituelle, selon les Précautions Standard, soit : - Sacs à linge usuels dans le vidoir, double emballage si souillé avec des liquides biologiques - Ne pas rincer le linge et/ou habit souillé à cause des risques de projection
Evacuation de la vaisselle	Aucune procédure particulière, suivre la filière habituelle (pas de vaisselle jetable)
Elimination des déchets	Filière habituelle, selon les Précautions Standard
Voisin.e de chambre	- Maintenir un isolement géographique - La-le voisin.e de chambre peut circuler librement - Selon avis médical et en cas de situation épidémique (>1 situation), dépistage par 1 frottis rectal et si présence sonde vésicale et plaie
Visites	- Autorisée - Ne pas s'asseoir sur le lit - Ne pas utiliser les WC en chambre - Désinfection des mains en entrant et en sortant de la chambre

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
Document de référence Infection entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi non E.coli (ESBL ou BLSE)/site internet HPCI Fribourg	2 / 5	17.09.2026

Nettoyage/Désinfection	
Matériel de soins	Nettoyage/Désinfection du matériel de soins entre chaque résident.e avec le détergent-désinfectant habituel
Linge et vêtements	Selon les Précautions Standard : • Nettoyage de la literie et du linge de bain à la machine à 60°C • Nettoyage des vêtements du résident.e à minimum 40°C • Changer le linge de lit et le linge de bain dès souillures et selon les règles institutionnelles
Environnement	Planification du nettoyage de la chambre en dernier. Pendant la durée des Mesures Additionnelles : • Nettoyage/Désinfection de l'environnement direct du résident.e (table de nuit, moyens auxiliaires, téléphone, sonnette, accoudoirs, télécommande ...), des sanitaires et du sol avec détergent-désinfectant habituel A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du résident.e : • Changement du rideau de séparation même si la-le résident.e reste dans la même chambre • Changement des linges de lit et des linges de bain à la levée de l'isolement • Nettoyage/Désinfection de l'environnement direct du résident.e, des sanitaires et du sol avec le détergent-désinfectant habituel

Déclaration obligatoire	
Médecin cantonal	Non, sauf si flambée (≥2 situations), les cas doivent être déclarés dans un délai de 24 heures via le formulaire de F/Flambée de résultats/Flambée de cas/OFSP A l'adresse e-mail : maltrans@secu.fr.ch

Références	- Document adapté selon les recommandations nationales de Swissnoso "Prevention and control of MDRO in the non-outbreak setting" (Version 1.0, octobre 2021, 1MB) - Selon Guide pratique 2024 de prévention et de traitement des infections en établissement médico-social
------------	---

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
Document de référence Infection entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi non E.coli (ESBL ou BLSE)/site internet HPCI Fribourg	3 / 5	17.09.2026

A plastifier et à coller sur la porte d'entrée de la chambre

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
<i>Document de référence Infection entérobactéries productrices de bétalactamases à spectre élargi non E.coli (ESBL ou BLSE)/site internet HPCI Fribourg</i>	4 / 5	17.09.2026

RESUME DES MESURES SPECIFIQUES

Mesures Additionnelles (MA)	CONTACT 
Hygiène des mains	Désinfection des mains à la solution hydroalcoolique avant d'entrer en chambre et en sortant de la chambre et selon les 5 indications de l'OMS  5 INDICATIONS DE BASE À RESPECTER Un geste d'hygiène des mains doit être pratiqué : - Avant contact patient ; - Après contact patient ; - Avant acte aseptique (propre) ; - Après liquides biologiques/gants ; - Après contact avec objet/environnement.
Equipement de Protection Individuel (EPI) pour le personnel	Avant d'entrer en chambre :  Surblouse pour tout contact direct avec la-le résident.e ou son environnement immédiat La surblouse peut être utilisée 24 heures (maximum 2 surblouses sur un statif en chambre)
Dispositifs médicaux	Privilégier matériel à usage unique Limiter au maximum le stockage de matériel en chambre Désinfecter le matériel avec le détergent/désinfectant habituel après usage
Linge	Evacuer le linge sale dans les sacs à linge au vidoir
Déchets	Evacuer les déchets dans le sac poubelle au vidoir Eliminer les piquants/tranchants dans les Safeboxe
Environnement	Nettoyage/Désinfection avec détergent/désinfectant habituel, en respectant le principe du plus propre au plus sale

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
Document de référence Infection entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi non E.coli (ESBL ou BLSE)/site internet HPCI Fribourg	5 / 5	17.09.2026