

RÉSEAU FRIBOURGEOIS DE SANTÉ MENTALE

FREIBURGER NETZWERK FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

RÉSEAU FRIBOURGEOIS
DE SANTÉ MENTALE
FREIBURGER NETZWERK
FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Buvidal-Buprénorphine dépôt : bilan après une année d'expérience



Dr Rafik Bouzegaou
médecin adjoint, Centre cantonal d'addictologie, RFSM
12 novembre 2026


Madame Claudine Gex
Pharmacie Plus Dr Repond
12 novembre 2026


- Déclaration de conflit d'intérêts

- Aucun intérêt financier
- Pas d’activité pour l’industrie pharmaceutique


RÉSEAU FRIBOURGEOIS
DE SANTÉ MENTALE
FREIBURGER NETZWERK
FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Les possibilités de TAO en 2026 dans le canton de Fribourg





- Début immédiat de la libération du principe actif après l'injection
- Le taux de libération est déterminé par la composition lipidique et la nanostructure du gel




1. Injection of liquid formulation using prefilled syringe
2. Encapsulating liquid crystal gel triggered by water uptake
3. Slow release of drug
4. Drug release and biodegradation of gel matrix to full resolution

NMP : N-methylpyrrolidone


1. Tiberg F et al. Chem Lett. 2012;41:1090-92; 2. Tiberg F et al. J. Drug Deliv Science Tech. 2011;21:101-9;

Les injections doivent être effectuées en alternance dans les zones d'injection suivantes : fesses, cuisses, abdomen et haut du bras, en respectant un intervalle d'au moins 8 semaines avant de réutiliser un site d'injection déjà utilisé. Les injections au niveau de la taille à moins de 5 cm du nombril doivent être évitées.

8 zones d’injections:




Recto **Verso**




Notice professionnelle Buvidal, version mars 2024, www.swissmedicinfo.ch

Illustration des profils pharmacocinétiques de population pour Buvidal et la buprénorphine sublinguale. Taux plasmatiques – Combien de temps dure l'effet ?

Buvidal Q1W - BPN sublingual quotidien



Buvidal Q4W - Buvidal Q1W



Analyse du modèle pharmacocinétique de population basée sur les données issues d'essais cliniques (N = 236). Les tests diagnostiques ont montré des concentrations de BPN prévisibles et une bonne concordance entre les données observées et les données prédites. Données à l'état d'équilibre. Axe des y logarithmique.

1- Albayaty M et al. Adv Ther. 2017;34:560-75; Données non publiées, Camurus ***AB, Suède;*** ***2- Björnsson M et al. Clin Pharmacokinet. 2023;62:1427-43***

• Conversion-Transfert vers le dépôt

- Clarifier **l'indication** avec le patient
- **Limitatio** vérifiée et documentée (liste des spécialités)

Buvidal Depot

Inj Lös 24 mg/0.48ml
(Buprenorphinum 24 mg)

Conformément à l'annexe 1 de l'OPAS (RS 832.112.31), cf. chapitre 8, Psychiatrie et psychothérapie / Traitement par agonistes opioïdes (TAO) en cas de syndrome de dépendance aux opioïdes.

Pour le traitement de substitution en cas de dépendance aux opioïdes chez les patients n'ayant pas présenté de réponse suffisante à un traitement par la buprénorphine administré par voie orale.
L'injection hebdomadaire à libération prolongée sert de traitement d'attaque.

- **Changement** possible **sans complication** d'un jour à l'autre
  - La veille : dernière prise du comprimé sublingual
  - Le jour du changement : injection s.c., pas d'autre comprimé



À ne pas oublier : **commander le dépôt à temps**, la livraison peut prendre plusieurs jours selon les cas


*Informations professionnelles Buvidal®, mise à jour : mars 2024, www.swissmedicinfo.ch

- # Quels sont les dosages disponibles de Buvidal ?



Posologie quotidienne SL BPN	Posologie hebdomadaire de Buvidal	Posologie mensuelle de Buvidal
2-6 mg	8 mg	-
8-10 mg	16 mg	64 mg
12-16 mg	24 mg	96 mg
18-24 mg	32 mg	128 mg

** Informations professionnelles Buvidal®, mise à jour : mars 2024, www.swissmedicinfo.ch*




Information professionnelle Buvidal®, version mars 2024, www.swissmedicinfo.ch

RÉSEAU FRIBOURGEOIS
DE SANTÉ MENTALE
FREIBURGER NETZWERK
FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

UNLOC-T

Consommation d'opioïdes non prescrits déclarées par les personnes concernées



La consommation d'opioïdes non prescrits déclarée par les patients a diminué entre le début de l'étude (97 %) et la semaine 16 (12 %) (OR = 0,0035, IC à 95 % : 0,0007-0,018, p < 0,0001)


Dunlop A et al. Addiction. 2021;117:382-91

RÉSEAU FRIBOURGEOIS
DE SANTÉ MENTALE
FREIBURGER NETZWERK
FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Satisfaction des patients vis-à-vis du traitement


Qualité de vie et charge thérapeutique avec Buvidal par rapport à un traitement quotidien par voie sublinguale à base de BPN/NX

Impression globale du patient sur l'amélioration (PGI-I)




Scale 1–7. A higher score indicates perceived worse health condition vs. the start of treatment.

Questionnaire sur la charge du traitement (TBQ)



Scale of 0–150. A higher score indicates greater treatment burden.

Qualité de vie dans le traitement de substitution aux opiacés (OSTQoL) - Domaine OST



Scale of 0–4. A higher score indicates better QoL.

BPN : buprénorphine ; NX : naloxone ; OSTQoL : qualité de vie dans le traitement de substitution aux opiacés ; PGI-I : impression globale du patient quant à l'amélioration ; PRO : résultat rapporté par le patient ; SL : sublingual ; TBQ = questionnaire sur la charge thérapeutique

Lintzeris N et al. JAMA Netw Open. 2021;4:e219041; données dans les dossiers, Camurus AB, Suède

6- Information et conseil appropriés

- Une technologie innovante permet une libération prolongée de buprénorphine
- Administration 1 fois par semaine ou par mois, par voie sous-cutanée (pas intramusculaire !)
- Si la dose est insuffisante, il est possible d'en administrer une dose supplémentaire
- L'injection est souvent décrite comme brûlante, mais supportable
- « Papule » souvent perceptible après l'injection en raison du dépôt
- Manipulation très similaire à celle d'un vaccin, aiguille fine (23 G), faible volume
- Information sur les avantages et les risques

1. Lofwall MR, et al. JAMA Intern Med. 2018 ; 178(6) : 764-773. 2. Frost M et al. Addiction. Août 2019 ; 114(8) : 1416-1426. * *Informations spécialisées Buvidal®, version : mars 2024, www.swissmedicinfo.ch*

• Quels sont les avantages du Buvidal ?

- **Une simplification/fléxibilité considérable du quotidien :**
- Plus besoin de prendre le médicament tous les jours (10 min sous la langue)
- Plus besoin d'y penser constamment
- Suppression des « obligations OAT » habituelles (pas de passages réguliers en pharmacie, les horaires, pas besoin de justifier les prises manquées, etc.)
- **Bonne observance du traitement, tolérance aux opioïdes garantie**
- **Sur le fond, d'autres discussions / objectifs thérapeutiques sont désormais possibles**
- **Voyager sans effort supplémentaire, sans limitations, sans autorisation**
- **Soutien d'un mode de vie sans trouble lié à la consommation de substances (pas de rituels de consommation quotidiens)**
- **Autonomie accrue et amélioration de la qualité de vie**

+1. Lofwall M et al. JAMA Int Med. 2018 ; 178 : 764-773. 2. Frost M et al. Addiction. 2019 ; 114 : 1416-1426. 3. Parkin S et al. Int J Drug Policy. Décembre 2023 ; 122 : 104221

• Quels sont les risques liés au Buvidal ?

- Tant qu'il n'y a pas d'autre trouble grave lié à la consommation de substances avec une forte sédation, le risque d'effets indésirables graves est faible avec le dépôt de buprénorphine.

- La Buprénorphine semble présenter un faible risque de dépression respiratoire potentiellement mortelle chez les adultes tolérants aux opioïdes en raison d'un effet plafond

1. Lofwall M et al. JAMA Int Med. 2018 ; 178 : 764-773. 2. Frost M et al. Addiction. 2019 ; 114 : 1416-1426. 3. Dahan A et al. Br J Anaesth. Mai 2006 ; 96(5) : 627-32. 4. Wightman RS et al. J Med Toxicol. Janvier 2021 ; 17(1) : 10-15

• Que faut-il prendre en considération ?

- **Absences** (en cas d'absences aux rendez-vous pour les injections de dépôt, un nouveau dosage peut être nécessaire)
- Information sur la perte progressive de tolérance en cas d'arrêt des injections
- **Effets indésirables** : l'insomnie et les maux de tête sont indiqués comme « très fréquents » dans le compendium des médicaments*
- Prise en charge des patients sous BuP à effet retard et opérations, traitements de la douleur
- Le retour à un agoniste complet de l'OAT nécessite plus de temps

* Informations spécialisées Buvidal®, version : mars 2024, www.swissmedicinfo.ch

RÉSEAU FRIBOURGEOIS
DE SANTÉ MENTALE
FREIBURGER NETZWERK
FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Merci de votre attention
Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Réseau fribourgeois de santé mentale
Centre Cantonal d'Addictologie

Rafik.Bouzegaou@rfsm.ch
T. +41 26 308 1700