



Formation continue
«Traitements basés sur la substitution» (TBS)

Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Posieux
6 octobre 2016

Atelier 4:

"Prescription de Ritaline®
pour la population adulte souffrant
d'addiction."




Formation continue
«Traitements basés sur la substitution» (TBS)

Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Posieux
6 octobre 2016

Atelier 4:

***"Prescription de méthylphénidate
pour la population adulte
souffrant d'addiction."***



Methylphenidate Hydrochloride

$C_{14}H_{19}NO_2 \cdot HCl$

MW = 269.77

Médicament	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (AMM)
Concerta[®] (<i>racémate</i>)	Janssen-Cilag AG
Equasym[®] XR (<i>racémate</i>)	Opopharma AG
Medikinet[®] / MR (<i>racémate</i>)	Salmon Pharma GmbH
Methylphenidat Sandoz[®] (<i>racémate</i>)	Sandoz Pharmaceuticals AG
Ritalin[®] / SR / LA (<i>racémate</i>)	Novartis Pharma Schweiz AG
Focalin[®] (<i>d-énantiomère</i>)	Novartis Pharma Schweiz AG



Utilisation admise pour les adultes


Médicament	Titulaire de l'AMM
Concerta [®]	entre 6 et 65 ans
Equasym [®] XR	de 6 à 17 ans
Medikinet [®] / MR	de 6 à 17 ans
Méthylphenidat Sandoz [®]	entre 6 et 65 ans
Ritalin [®] / SR / LA	de 6 à 17 ans
Focalin [®]	entre 6 et 65 ans



Utilisation "hors label" pour les adultes

Médicament	Contre-indications
Concerta®	abus d'alcool et de drogues; troubles du rythme cardiaque; ...
Methylphenidat Sandoz®	abus d'alcool et de drogues; troubles du rythme cardiaque; ...
Focalin®	abus d'alcool et de drogues; troubles du rythme cardiaque; ...





Remise de méthylphénidate dans le canton de Fribourg



- *L'évaluation des quantités ne permet pas de se prononcer sur le bien-fondé ou/et sur la conduite des traitements par les médecins.*
- *Manifestement, toujours plus de patient(e)s sont traité(e)s.*
- *Les patient(e)s concerné(s) doivent être traité(e)s.*

Remise de méthylphénidate dans le canton de Fribourg (2015)

Médicament	quantités 2015 (g)	%
Concerta[®]	3'296	38%
Equasym[®] XR	484	6%
Medikinet[®] / MR	946	11%
Méthylphenidat Sandoz[®]	406	5%
Ritalin[®] / SR / LA	3'131	36%
Focalin[®] (<i>calcul basé sur la forme "racémate"</i>)	369	4%
Total	8'632	100%

Remise de méthylphénidate
dans le canton de Fribourg (2015)

Concerta® par dosage	quantités 2015 (g)	%
Concerta® 18 mg	464	14%
Concerta® 27 mg	922	28%
Concerta® 36 mg	1044	32%
Concerta® 54 mg	866	26%
Total	3'296	100%

... **une fois par jour**, mais souvent en
combinaison avec d'autres médicaments
(raisons pharmacocinétiques)



- Le traitement ne doit être commencé **que par des médecins spécialisés** dans les troubles du comportement et doit également être surveillé par ceux-ci.
- Le **diagnostic** devrait être posé suivant les critères **DSM** actuels ou la classification **ICD**.
- Le méthylphénidate devrait être utilisé en tant que partie d'un **programme thérapeutique complet** qui comporte des mesures psychologiques, éducationnelles et sociales.
- La **dose maximale** est de l'ordre de 70mg par jour.



Analyse des ordonnances

Qui prescrit (spécialistes / médecins de médecine générale)?


Classe d'âge des patient(e)s

Posologie?

Jeunes-filles et femmes / jeunes garçons et homme?

Autres médicaments utilisés?

...



**... devrait être réalisée en 2017
(FR, JU, NE)**



	Concerta[®]	Methylphénidate Sandoz[®]
comprimé à 18 mg	1.65 Fr	1.38 Fr
comprimé à 27 mg	2.00 Fr	1.64 Fr
comprimé à 36 mg	2.23 Fr	1.83 Fr
comprimé à 54 mg	2.60 Fr	2.13 Fr

Le générique coûte environ 20% de moins que le produit original.

Vignette clinique 1

- Patient A. B., 34 ans, polytoxicomane
- Traitement de substitution avec méthadone 120 mg/jour, auparavant héroïne en IV
- Consommation actuelle dominée par l'alcool (bière et vin quotidiennement), la cocaïne (sniff, 2 x par semaine, env. 1 g) et le cannabis (env. 5 x par semaine, 3-5 joints)
- Diagnostic de TDAH enfant, a pris de la Ritaline jusqu'à 18 ans
- Anamnèse sociale : chômeur, travailleur occasionnel, chambre chez sa mère, pas de structure journalière
- Le patient arrive au cabinet et demande à être à nouveau mis sous méthylphénidate
- Comment procédez-vous ? Que décidez-vous ?

Vignette clinique 2

- Patiente M. K., 29 ans, héroïnomane, usage nocif de benzodiazépines
- La patiente exprime son désir d'enfant au médecin
- Suspicion de diagnostic de TDAH
- La patiente a déjà fait plusieurs traitements de sevrage, rechute régulièrement, en particulier consommation de cocaïne. Elle voit d'un œil critique les traitements de substitution.
- Elle a entendu parler du méthylphénidate et se demande si cela pourrait calmer sa « faim » de cocaïne.
- Comment procédez-vous ? Que décidez-vous ?