



Conflits

La fouine est une espèce qui a pu s'adapter à la présence humaine. Ses populations sont en augmentation, surtout en milieu urbain.

La fouine joue un rôle dans la régulation de certains rongeurs. Cependant, elle peut devenir un hôte indésirable et poser des problèmes de cohabitation. Elle peut être responsable de dégâts dans les toitures, s'attaque aux câblages des voitures ou empêche de dormir.


Toutefois, cohabiter avec la fouine est possible. Vous trouverez dans ce guide quelques conseils.



Que faire?

Toiture

1. Repérer les petits passages en bouchant les accès avec du papier de journal chiffonné. Si c'est un passage, la fouine enlèvera l'obstacle.
2. Obturer les accès (> 5 cm) à la toiture par la pose de grillage, de préférence en automne.
3. Couper les branches d'arbres touchant ou surplombant une habitation (la fouine peut sauter jusqu'à 3 m).
4. Placer un obstacle à 2,5 m de hauteur sur la gouttière (voir schéma).
5. Eviter la présence des déchets ménagers, sources de nourriture.
6. Ne laisser aucune nourriture pour chat à l'extérieur pendant la nuit.



La Fouine



Nuisances

Nuisances sonores et olfactives

- * Bruits de déplacements dans la toiture la nuit.
- * Cris en période de rut (début d'été) et de faux rut (janvier/février).
- * Excréments, urine, proies en décomposition.

Dégâts des toitures

- * Dégâts aux isolations des toitures.

Dégâts aux voitures

- * Dégradation de l'isolant de câbles électriques et des durites.



Dégâts aux élevages

- * Prédation dans les poulaillers et dans les petits élevages.



Que faire?

Poulailler et élevages

1. Enfermer les animaux pendant la nuit.
2. Grillager les entrées potentielles (> 5 cm).

Automobile

1. Obturer les accès (> 5 cm) au garage
2. Laver la voiture ainsi que le moteur pour enlever les marques territoriales laissées par les fouines (urines).
3. Protéger les câbles et les conduites.
4. Equiper sa voiture d'un appareil anti-fouine à décharge électrique.

Méthodes d'effarouchement

1. Perturber l'animal la nuit grâce à des bruits divers irréguliers (radio, réveil, ...)
2. Placer des répulsifs olfactifs aux entrées des lieux fréquentés (produit spécifique, parfums, javel, ...)



Contact

Si les problèmes avec les fouines persistent, veuillez prendre contact avec le garde-faune de votre région ou la centrale du SFN.



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service des forêts et de la nature SFN



www.fr.ch/sfn

Portrait

Nom scientifique	<i>Martes foina</i>
Poids	♀ : 0,8 à 1.7 kg ♂ : 1,1 à 2 kg
Taille	de 40 à 56 cm
Couleur	Brun-grisâtre, avec une gorge blanche (appelée bavette)
Régime alimentaire	Principalement carnivore
Famille	Mustélidé
Cousins	Martre, belette, blaireau, putois
Cycle d'activité	Nocturne
Portée	2 à 5 petits par portée
Période de protection	Du 16 fév. au 31 août

Habitat


A l'origine, la fouine est un animal qui vivait surtout dans les rochers. Mais, de nos jours, ses habitats de prédilection sont les constructions humaines.



Indices de présence

Les empreintes

Elles sont constituées de 5 doigts terminés par des griffes. Le pouce est souvent visible.




Les crottes

Elles sont de forme cylindrique spiralée et ont souvent une odeur rebutante. Elles sont régulièrement déposées dans des endroits surélevés d'un bâtiment.




Répartition

La fouine est présente dans toute la Suisse, principalement dans les zones urbaines. On la trouve aussi en montagne jusqu'à 2'000 m d'altitude.



Martre ou Fouine ?

La fouine et la martre (*Martes martes*) sont extrêmement semblables. Elles ont une taille et un poids très proche. Cependant, il est possible de faire la différence entre ces deux mustélidés grâce à la truffe et à la bavette.



Biologie

La fouine est principalement carnivore. Elle se nourrit de petits rongeurs, d'oiseaux, d'insectes et de vers de terre. En été, elle se nourrit aussi des fruits mûrs. Son territoire de chasse couvre une surface de 80 à 150 hectares.

Le rut a lieu en juillet-août. Cependant la nidification des ovules est différée jusqu'en janvier. Durant cette période, on observe un faux rut. La mise-bas a lieu en avril. Une portée compte entre 2 et 5 petits, qui restent les yeux fermés pendant une quarantaine de jours. Les petits sont sevrés à 3 mois. La maturité sexuelle est atteinte au cours de la deuxième année.