# Echinococcose

Le renard héberge un petit ténia, Echinococcus multilocularis, dont les œufs sont éliminés avec ses crottes. Son hôte habituel est le campagnol ; l'être humain ne s'infecte qu'accidentellement, en avalant des œufs. Les larves se développent alors dans le foie, à la manière d'une tumeur. Prise à temps, la maladie se soigne bien. En Suisse : 10 à 28 nouveaux cas par an.


Pour s'en protéger :
1. laver fruits, légumes et baies, et se laver les mains après le jardin ;
2. ramasser les crottes du jardin dans un sac et les jeter à la poubelle ;
3. vermifuger chaque mois les chiens et chats chasseurs de souris.

# Que faire?

**Basse-cour et petits animaux de rente**

Protégez vos animaux en les tenant dans un enclos

1. Le grillage doit être enterré à une profondeur de 30 à 50 cm.
2. L'enclos doit être couvert.
3. Si l'enclos ne peut être couvert, il doit avoir une hauteur de 2 m. On peut rajouter un fil électrique à 30 cm au dessus du sol ou sur la bordure supérieure de la clôture.
4. Utiliser du grillage dont les mailles n'excèdent pas 30 mm de largeur, cela empêchera le passage des fouines.
5. Les renards sont capables d'ouvrir des verrous simples. Utiliser un système de fermeture adapté.




# Le renard



# Conflits

Les renards sont nombreux mais la population varie d'une année à l'autre. Les dégâts sont liés à cette évolution.

Les conflits avec les renards peuvent souvent être résolus.

Les méfaits les plus fréquents causés par maître goupil sont :
- Eventrer les sacs-poubelle et disperser leur contenu
- Voler des outils de jardin ou des chaussures
- Faire ses besoins dans le jardin
- Tuer des animaux de rente

# Que faire?

**Empêcher les renards d'entrer dans le jardin**

1. Sortir les poubelles juste avant le ramassage afin que le renard ne puisse les éventrer.
2. Enlever tout objet pouvant être utilisé comme jouet: ne laisser aucun accessoire de jardin, chaussures ou gants à l'extérieur durant la nuit.
3. Ne pas disposer de nourriture pour vos animaux de compagnie à l'extérieur la nuit.
4. Couvrir le compost ou utiliser un conteneur fermé.
5. Ne pas mettre de restes de viande, d'os ou de fromage, ainsi que des aliments cuits sur le compost.
6. Recouvrir au plus vite les trous qu'ils creusent.

# Contact

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le ou la garde-faune de votre région ou avec la centrale du SFN.

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

**Service des forêts et de la nature** SFN
**Amt für Wald und Natur** WNA

www.fr.ch/sfn

# Portrait

| | |
|---|---|
| Nom scientifique | *Vulpes vulpes* |
| Famille | Canidés |
| Cousin | Chien |
| Poids | 6 - 9 kg |
| Taille sans queue | 50 - 80 cm |
| Couleur | La gorge et le ventre varient du roux au blanc |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| Durée de vie | jusqu'à 8 ans |
| Cycle d'activité | Surtout nocturne |
| Portée | 4 - 5 renardeaux |
| Période de protection | 1er mars - 15 juin |

# Habitat


Les renards vivent dans des habitats très variés. Ils peuvent vivre autant en forêt, au bord d'une rivière qu'en zone urbaine.



# Indices de présence

**Empreintes**

Chez le renard, on peut tracer une ligne horizontale et deux obliques sans couper les traces de pelotes. Chez la plupart des chiens, c'est impossible.




# Répartition

Le renard peuple la Suisse entière en dessous de 2500 m d'altitude.



# Biologie

Le renard est un omnivore très flexible. En Suisse, les mulots et les campagnols sont ses proies principales, devant les oiseaux. Les lombrics, les insectes, les fruits et les baies complètent son menu, de même qu'une part importante d'aliments d'origine humaine : composts, déchets ménagers, abords des fermes. Plus un territoire est riche en nourriture, plus il est petit.

Le rut du renard se déroule de mi-janvier à mi-février. La renarde met bas en moyenne 5 renardeaux. Les petits vivent avec leurs parents jusqu'en automne, puis partent chercher leur propre territoire et un partenaire.

# La gale

La gale est une maladie de la peau, fortement contagieuse, qui entraîne souvent la mort du renard. La transmission se fait par contact direct et reste marginale chez l'être humain. Même si la guérison se fait spontanément chez l'homme, elle peut provoquer de fortes démangeaisons. C'est pourquoi il ne faut jamais toucher un animal mort, surtout sans gants. En cas de découverte, avisez le/la garde-faune de la région ou la gendarmerie.

Il peut arriver que la gale soit transmise aux animaux domestiques. Si votre animal de compagnie a eu un contact direct, en se bagarrant ou en se frottant contre un renard galeux, nous vous conseillons de prendre contact avec votre vétérinaire.