

# Les amphibiens présents aux Gurles

L'étang est le site principal de reproduction mais on trouve aussi des pontes dans les gouilles ou les petits canaux à courant lent. La plupart des espèces quittent l'étang après la ponte et se réfugient dans les prairies humides et en forêt. Ouvrez l'œil !



La **Grenouille rousse** est reconnaissable entre autres à ses taches brunes derrière les yeux. Elle pond dès fin février dans les eaux peu profondes puis retourne dans les champs et en forêt. Les œufs forment de grosses masses gélatineuses. Toute la population pond en l'espace de quelques jours.

Le **Crapaud commun** : ils arrivent en grand nombre dès mars à l'étang pour se reproduire. Les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles. Ces derniers, grands flemmards, se laissent porter par leurs compagnes jusqu'à l'étang. Le mâle n'a pas de sac vocal. Les crapauds sont incapables de sauter et se déplacent en marchant.



Les **grenouilles vertes** : il existe trois espèces de grenouilles vertes en Suisse : la Grenouille rieuse, la Grenouille de Lessona et la Grenouille verte. La plus grande est la Grenouille rieuse. Cette espèce a été introduite chez nous pour la consommation des cuisses. Echappée des élevages, elle envahit aujourd'hui les plans d'eau naturels et prend peu à peu la place des espèces indigènes. Il est très difficile de différencier les trois espèces. Les grenouilles vertes pondent en avril et restent dans les plans d'eau quelque temps. Les mâles possèdent deux sacs vocaux dont ils font usage au printemps pour signaler leur présence.



Le **Triton alpestre** : on reconnaît le mâle à son ventre orange sans tache. Il se reproduit dès février dans tous les types d'eau. Pour séduire les femelles, les mâles diffusent des odeurs caractéristiques. Les tritons sont actifs la nuit.