



COVID-19 : Recommandations de vaccination automne 2022 (Etat au 21 octobre 2022)

| | Vaccination de base | | Vaccination de rappel | |
|--|---|--|--|---|
| | Nombre de doses recommandées | Vaccins | Nombre de doses recommandées | Vaccins |
| Enfants et adolescents de 5 à 15 ans | | | | |
| 5 à 11 ans | Aucune vaccination recommandée | | Aucune vaccination de rappel n'est recommandée | |
| 5 à 11 ans avec maladie chronique¹ | 1 dose (2 doses possibles) | Pfizer monovalent | Aucune vaccination de rappel n'est recommandée | |
| 5 à 11 ans immunodéficience sévère | 2 doses + sérologie. En l'absence d'anticorps, 3 ^{ème} dose | Pfizer monovalent | Aucune vaccination de rappel n'est recommandée | |
| 12 ans à 15 ans | Aucune vaccination recommandée | | Aucune vaccination de rappel n'est recommandée | |
| 12 à 15 ans avec maladie chronique¹ | 1 dose (2 doses possibles) | Pfizer monovalent | Aucune vaccination de rappel n'est recommandée | |
| 12 à 15 ans immunodéficience sévère | 3 doses | Pfizer monovalent | 1 dose ⁵ | Pfizer monovalent |
| Personnes à partir de 16 ans | | | | |
| 16 ans à 64 ans | 1 dose ² | Pfizer monovalent ³ Moderna monovalent Nuvaxovid ⁴ | 1 dose ⁵ | Moderna bivalent ⁶ Pfizer bivalent ⁶ Nuvaxovid ⁴ |
| 65 ans et plus, autres personnes vulnérables¹ | 2 doses | Pfizer monovalent Moderna monovalent Nuvaxovid ⁴ | 1 dose ⁵ | Moderna bivalent ⁶ Pfizer bivalent ⁶ Nuvaxovid ⁴ |
| Personnel de santé, personnes assurant la prise en charge des personnes vulnérables¹ | 1 dose ² | Pfizer monovalent ³ Moderna monovalent Nuvaxovid ⁴ | 1 dose ⁵ | Moderna bivalent ⁶ Pfizer bivalent ⁶ Nuvaxovid ⁴ |
| 16 ans et plus immunodéficience sévère | 3 doses | Pfizer monovalent ³ Moderna monovalent | 1 dose ⁵ | Moderna bivalent ⁶ Pfizer bivalent ⁶ |

1 Personnes avec maladies chroniques : [catégories de personnes vulnérables](#), trisomie 21, femmes enceintes.

2 Ne donne pas droit à un certificat COVID mais uniquement à un justificatif.

3 Pfizer pour les moins de 30 ans.

4 La vaccination avec le Nuvaxovid n'est pas recommandée pour les femmes enceintes ou qui allaitent.

5 L'intervalle écoulé depuis le précédent vaccin contre le COVID-19 ou une infection avérée au COVID-19 doit être de 4 mois au moins.

6 Chez les personnes de 16-17 ans, la vaccination de rappel avec un vaccin à ARNm bivalent est effectuée en dehors de l'autorisation de Swissmedic (hors étiquette).