

Informationen für die Ärztinnen und Ärzte

Vorgehen für die am kantonalen HPV-Impfprogramm teilnehmenden Ärztinnen/Ärzte

Handlungen	Erläuterungen	Unterlagen (KAA-Website)
1. Meldung beim KAA per Telefon oder Mail	Zugelassen werden können Fachärztinnen und Fachärzte für Pädiatrie, Gynäkologie, Allgemeinmedizin oder Innere Medizin sowie Hausärztinnen und Hausärzte.	Liste der am HPV-Impfprogramm teilnehmenden Ärztinnen/Ärzte
2. Bestellung des Impfstoffs	<ul style="list-style-type: none">• Gardasil 9® mindestens 2 Dosen, sonst werden der Ärztin/dem Arzt zusätzliche Kosten verrechnet (administrativer Aufwand und Versand).• Die bestellten Impfdosen werden vom Lieferanten direkt dem Kanton verrechnet.	Bestellformular Gardasil 9®
3. Entschädigung	<ul style="list-style-type: none">• Rechnungsformular: Anzahl verabreichter Injektionen (Seite 1) eintragen und Kontrolltabelle (Seite 2) ausfüllen.• Jeden Monat an das KAA senden.	Rechnung HPV-Impfungen Schulärztinnen und Schulärzte Rechnung HPV-Impfungen Privatpraxen

Häufig gestellte Fragen

Wie können die zum kantonalen HPV-Impfprogramm zugelassenen Jugendlichen bestimmt werden?

Das kantonale HPV-Impfprogramm richtet sich an Mädchen und junge Frauen im Alter von 11 bis 27 Jahren geimpft. Ausserdem richtet es sich an Knaben und junge Männer zwischen 11 und 27 Jahren. [Die Zulassungstabelle](#) auf der KAA-Website gibt Auskunft über die zugelassenen Jahrgänge.

Wie viele Dosen sind erforderlich?

Jugendliche reagieren mit höheren Antikörpertitern auf die HPV-Impfung als Erwachsene. Mehrere Studien haben bewiesen, dass zwei Dosen ausreichen, wenn die erste Dosis vor dem 15. Lebensjahr verabreicht wird (0, (4) 6 Monate). Drei Dosen (0, 2, 6 Monate) sind notwendig, wenn die erste Dosis nach dem 15. Geburtstag verabreicht wird, oder wenn die zwei ersten Dosen innerhalb von weniger als vier Monaten gegeben wurden.

Darf die Impfung gleichzeitig mit anderen Impfungen verabreicht werden?

Die HPV-Impfung kann gleichzeitig mit der Impfung gegen Hepatitis B und jener gegen Diphtherie-Tetanus (dT/dTpa) an unterschiedlichen Einstichstellen verabreicht werden.

In welcher Form sind die Impfstoffe erhältlich?

Die Impfstoffe gibt es in Fertigspritzen mit 0,5 ml Injektionssuspension.

Wie lange ist der Impfstoff haltbar?

Die Haltbarkeitsdauer beträgt sechs Monate.